

UWAGA!

Preparat środek jest środkiem ochrony roślin lub środkiem sanitarnym w zależności od rejestracji w odpowiednim urzędzie polskim lub jednego z krajów Unii i do stosowania w silosach i magazynach nasion przeciwko gryzoniom nasion oraz szkodnikom nasion jak szczur mysz wołek trojszyk i inne jak też kretom na terenach otwartych jak ogrody itp według zaleceń i opisów na etykietach opakowań.

Środki ostrożności dotyczące preparatów zawierających fosforowodor aluminium lub glinu 56 GE o nazwach phostoxin, gastoxin, detia, arvalin phos, quickphos i delicia:

Środek wydziela śmiertelny gaz fosforowodor-fosfinę w styczności z glebą lub pod wpływem wilgotności atmosferycznej.

Środki ostrożności:

1. Nie wykonywać zabiegu podczas deszczu. Nie wolno lać wody na środek.
2. Nie wachać.
3. Stosować pełną maskę przeciwgazową lub półmaskę gazową z okularami i kombinezon.
4. Nie brać tabletek w gołą rękę tylko przez rękawice gumowe jeśli to konieczne.
5. Nie palić podczas wykonywania zabiegu fosforowodor jest łatwopalny i wybuchowy.
6. Najlepiej sypać bezpośrednio z opakowania lub za pomocą aplikatora.
7. Użyć jednorazowo całe opakowanie - zalecane.
8. Trzymać z dala od dzieci w miejscu niedostępnym.
9. Nie stosować przy fundamentach budynków mieszkalnych bo gaz może się przedostać do budynków.
10. Nie stosować na strychach zamieszkiwanych domów i pomieszczeniach inwentarskich w obecności zwierząt.
11. Zakaz stosowania w piwnicach pod domem zamieszkiwanym, mieszkaniach i domach gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta
12. Nie trzymać nie przechowywać preparatu środka w mieszkaniu, piwnicy lub domu tylko w budynku wolnostojącym z przewiewem nie mającym kontaktu bezpośredniego styczności z mieszkaniem-domem i budynkami sąsiadów.

Stosowanie przy fumigacji nasion w silosach magazynach:

1. Przy stosowaniu w magazynach silosach nasion wyłączyć prąd w obiektach na czas gazowania.
2. Okres karencji w silosach lub magazynach minimum 3 dni do 14 dni w zależności od wilgotności powietrza.
3. Po tym czasie przewietrzyć przez minimum 24 godziny do 48 godzin silosy magazyny składowania nasion.

Stosowanie przy kretach:

Odsypać ziemię z kopca otwór udrożnić głęboko kijem wrzucić nie więcej niż 5 sztuk pałek lub 1 tabletkę (paletki czy tabletki napis na opakowaniu Pellets lub Tablets) do otworu głęboko, wcisnąć papier w otwór by uszczelnić i zasypać kopiec szczelnie ziemią.

Środki ostrożności:

Stosować pełną maskę przeciwgazową lub półmaskę gazową z okularami i rękawice gumowe, nie wachać, nie robić zabiegu w deszczu, nie zalewać wodą, nie stosować bezpośrednio przy fundamentach budynków zamieszkałych, nie stosować w piwnicach pod zamieszkałymi budynkami ani na strychach. Zabezpieczyć teren na czas zabiegu. Nie pozwolić zwierzętom ani ludziom na chodzenie po terenie na czas gdzie wykonywany jest zabieg.

Okres karencji:

48 do 72 godzin na zewnątrz w trawnikach, nieużytkach, polach, terenach otwartych i wybiegach dla zwierząt.

Przechowywanie:

Nie trzymać nie przechowywać preparatu środka w mieszkaniu, piwnicy lub domu tylko w budynku wolnostojącym z przewiewem nie mającym kontaktu bezpośredniego styczności z mieszkaniem-domem i budynkami sąsiadów.

Zakup może dokonać tylko osoba pełnoletnia powyżej 18 ego roku życia i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

